

TRATTAMENTO ERADICANTE PER L'HELICOBACTER Pylori

Terapia di I linea			
	Modalità di assunzione		Durata
Omeprazolo 20mg	1cp prima di colazione	1cp prima di cena	14 giorni
Amoxicillina 1g.	1cp dopo colazione	1cp dopo cena	14 giorni
Metronidazolo 250mg	2cp dopo colazione	2cp dopo cena	14 giorni
Claritromicina 500mg	1cp dopo colazione	1cp dopo cena	14 giorni

Terapia di II linea					
	Modalità di assunzione				Durata
Omeprazolo 20mg	1cp prima di colazione		1cp prima di cena		
Pylera	3cp dopo colazione	3cp dopo pranzo	3cp dopo cena	3cp prima di coricarsi	10 giorni

Terapia di III linea			
	Modalità di assunzione		Durata
Omeprazolo 20mg	1cp prima di colazione	1cp prima di cena	14 giorni
Amoxicillina 1g.	1cp dopo colazione	1cp dopo cena	14 giorni
Levofloxacina 250mg	1cp dopo pranzo	1cp dopo cena	14 giorni

Alternativa in pazienti ALLERGICI a penicilina			
	Modalità di assunzione		Durata
Omeprazolo 20mg	1cp prima di colazione	1cp prima di cena	10 giorni
Metronidazolo 250mg	2cp dopo colazione	2cp dopo cena	10 giorni
Claritromicina 500mg	1cp dopo colazione	1cp dopo cena	10 giorni